

COMMENT DÉPISTER / DIAGNOSTIQUER PRÉCOCEMENT LE CANCER DU PANCRÉAS

FACTEURS DE RISQUE

FACTEURS MAJEURS

Génétiques (5-10%)
Pancréatite héréditaire (PRSS1),
BRCA2,
Mélanome familial (FAMMM),
Agrégations familiales K pancréas

Lésions pré-cancéreuses
Tumeurs intra-canalaires
papillaires et mucineuses (TIPMP),
Cystadénome mucineux

FACTEUR MINEURS

Tabac
Diabète (> 2 ans)
Pancréatite chronique

SIGNES D'ALERTE

Pancréatite aigue inexpliquée,
Décompensation inexpliquée
d'un diabète,
Douleurs abdominales et/ou
amaigrissement inexpliqués

Scanner abdominal en 1^{re} intention

CENTRÉ SUR LE PANCRÉAS, COUPES 1,25MM, 3 TEMPS (SANS INJECTION, ARTÉRIEL, PORTAL),
REPLISSAGE DIGESTIF À L'EAU

SI LÉSION VISIBLE OU SI SCANNER NORMAL MAIS FACTEUR
DE RISQUE MAJEUR ET / OU SIGNE D'ALERTE

Consultation CBIPPS

Écho-endoscopie +/- ponction pour confirmation histologique si tumeur
Scanner, IRM, petscan pour bilan d'extension

Réunion de concertation
pluridisciplinaire de cancérologie

PAS DE TUMEUR

Surveillance si risque majeur

TUMEUR CURABLE

Chirurgie, chimiothérapie,
radiothérapie

TUMEUR AU STADE PALLIATIF

CPRE – prothèse biliaire, Chimiothérapie,
Radiothérapie, Soins de support